

**มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลายเชิงรุกในโรงพยาบาล  
และการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลายในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

\*\*\*\*\*

**มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลายเชิงรุกในโรงพยาบาล<sup>1</sup>**

1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง กำจัดเศษภาชนะที่ไม่ได้ใช้งานและมีน้ำขัง เช่น ที่รองน้ำทิ้งตู้กดน้ำ ขยะพลาสติก ขยะโฟม คว่ำจานรองกระถางทั้งหมด และทำอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง โดยเฉพาะบ้านพักเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
2. จัดทำ Dengue corner ให้เป็นสัดส่วนชัดเจน เพื่อบริการระบาดของโรคไข้เลือดออก
3. สื่อสารให้ความรู้ เรื่องอาการป่วยที่ต้องสงสัยไข้เลือดออกให้เจ้าหน้าที่ ญาติผู้ป่วย และผู้มารับบริการ ได้ทราบถึงอาการที่ต้องมารับการตรวจวินิจฉัย และรักษาที่โรงพยาบาล
4. ควรแจกยาทากันยุงให้ผู้ป่วย
5. เตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก CPG, ทบทวนทะเบียนรายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษา
6. งดการใช้แจกันใส่น้ำปลุกต้นไม้ แต่ถ้าใช้ ต้องเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์
7. จัดทำมุ้งลวดหรือมุ้งตาข่าย ในหอผู้ป่วยที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดรวดเร็ว กระจายไปหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยรวมถึงทั่วโลก ทำให้การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลาย เช่น การสำรวจลูกน้ำยุงลาย และการควบคุมโรคกรณีพบผู้ป่วยโรคติดต่อโดยยุงลายที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการดำเนินการ ทั้งนี้ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลายมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อด้วงจรรยาบรรณของโรคและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อโดยยุงลายเป็นวงกว้าง แต่เนื่องด้วยมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นสิ่งสำคัญ

การดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยูงลายในสถานการณ์ที่มีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)<sup>2</sup>

	การสำรวจลูกน้ำยูงลาย	การควบคุมยุงตัวเต็มวัย
ก่อนการปฏิบัติงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้ปฏิบัติงาน ควรสังเกตอาการของตนเอง หากมีไข้มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้งดการปฏิบัติงานและแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที</li> <li>2. หน่วยงานที่ทำหน้าที่ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยูงลาย ควรเฝ้าระวัง คัดกรองผู้ปฏิบัติงานก่อนลงพื้นที่ทุกครั้ง หากพบผู้ปฏิบัติงานมีไข้มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรืออาการเข้าได้กับนิยามโรค COVID-19 ให้งดการปฏิบัติงานและปฏิบัติ ตามมาตรการของรัฐบาล</li> <li>3. หน่วยงานที่ทำหน้าที่ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยูงลาย ควรจัดเตรียม หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เจลล้างมือให้เพียงพอแก่ผู้ปฏิบัติงาน</li> <li>4. สิ่งของหรืออุปกรณ์ที่อาจต้องใช้ร่วมกัน เช่น ไฟฉาย คลิปบอร์ด ให้มีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนการใช้งานเสมอ</li> <li>5. ผู้ปฏิบัติงานต้องรักษาสุขภาพอนามัยตนเองเสมอ เช่น หมั่นล้างมือ</li> <li>6. ผู้ปฏิบัติงานพ่นสารเคมี ควรสวมชุดป้องกันสารเคมี หน้ากากที่สามารถกรองตัว ทำลายอินทรีย์ ฤงมือ และรองเท้าบูท</li> </ol>	
ระหว่างปฏิบัติงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สำรวจลูกน้ำยูงลาย</li> <li>2. เว้นระยะห่าง</li> <li>3. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาปฏิบัติงาน</li> <li>4. หมั่นล้างมือ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ควบคุมวัณระยะห่าง</li> <li>2. ผู้ปฏิบัติงานพ่นสารเคมี ควรสวมชุดป้องกันสารเคมี สวม หน้ากาก ฤงมือ รองเท้าบูท</li> </ol>
หลังการปฏิบัติงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. หลังการปฏิบัติงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานสังเกตอาการตนเอง หากผู้ปฏิบัติงานมีไข้มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรืออาการเข้าได้กับนิยามโรค COVID-19 ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา ทราบ และปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล กรณีป้องกันโรค COVID-19 ทันที</li> <li>2. หลังใช้สิ่งของหรืออุปกรณ์ที่อาจจะต้องใช้ร่วมกันเสร็จสิ้น ให้มีการทำความสะอาดด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ 75 % เสมอ</li> </ol>	

รายการอ้างอิง

1. จากหนังสือ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0411.4/; 332 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยูงลายเชิงรุกในพื้นที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. โดยกระทรวงสาธารณสุข, 2563, นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข
2. กองโรคติดต่อ นำโดยยูงลาย กรมควบคุมโรค. คำแนะนำในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยูงลายในสถานการณ์ที่มีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกระทรวงสาธารณสุข, 2563, นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข