

คำแนะนำในการตรวจภายใน และมะเร็งปากมดลูก

****หมายเหตุ ผู้ที่จะตรวจต้อง
ประจำเดือนหมด อย่างน้อย 7
วัน**

-ไม่อยู่ระหว่างมีประจำเดือน
-ไม่สวนล้างช่องคลอด

-ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนมาตรวจ
1 วัน

ชนิดของการตรวจมะเร็งปากมดลูก

1.แปปสเมียร์ Pap Smear	2.ลิกวิดเบสท์ Liquid Base	3.ลิกวิดเบสท์+หาเชื้อ ไวรัส เอช พี วี Liquid Base+ HPV DNA
<p>แพทย์เก็บเซลล์จากปากมดลูกป้ายบนกระดาษ ไม่สามารถแยกมูกเลือดที่บดบัง หรือ เซลล์ปนเปื้อนที่ซ่อนทับได้ อ่านผลยาก มีโอกาสผิดพลาด</p>	<p>ใช้น้ำยาพิเศษสลายมูกเลือดและเม็ดเลือดแดง ค้นหาเซลล์มะเร็งได้ง่ายขึ้น</p>	<p>นำเซลล์ปากมดลูก ในน้ำยาจากวิธีลิกวิดเบสท์ไปตรวจหาเชื้อไวรัส เอช พี วี เพื่อพยากรณ์ความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อไวรัส เอช พี วี ได้ในขนาด</p>
<p><u>วิธีนี้เหมาะสำหรับ</u> -ผู้ที่อายุ 70 ปีขึ้นไป หรือ -ผู้ที่ตัดมดลูกออกไปแล้ว หรือไม่มีปากมดลูก</p>	<p><u>วิธีนี้เหมาะสำหรับ</u> -ไม่จำกัด อายุ -ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว</p>	<p><u>วิธีนี้เหมาะสำหรับ</u> -ผู้ที่อายุ 30 ปีขึ้นไป -ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว</p>
<p><u>ข้อแนะนำ</u> -ตรวจซ้ำทุกปี</p>	<p><u>ข้อแนะนำ</u> -ตรวจซ้ำทุกปี</p>	<p><u>ข้อแนะนำ</u> -หากไม่พบเชื้อ เอช พี วี **เว้น 3 ปี ตรวจซ้ำ**</p>
<p>ความไวในการตรวจพบมะเร็งระยะแรก 53%</p>	<p>ความไวในการตรวจพบมะเร็งระยะแรก 74%</p>	<p>ความไวในการตรวจพบมะเร็งระยะแรก 96%</p>
<p>ราคาค่าตรวจ 200 บาท</p>	<p>ราคาค่าตรวจ 600 บาท</p>	<p>ราคาค่าตรวจ 1600 บาท</p>
<p>ผู้มีสิทธิ เบิกคืนได้ 200</p>	<p>ผู้มีสิทธิ เบิกคืนได้ 200</p>	<p>ผู้มีสิทธิ เบิกคืนได้ 200</p>